


**Trianum** <sup>P</sup>



Trichoderma harzianum T-22

**KOPPERT**  
BIOLOGICAL SYSTEMS

## TRIANUM-P

Reg. nr: 5041. Endast för yrkesmässigt bruk.

Biologisk fungicid mot Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia och Microdochium. Mot svampangrepp i odlingar av gurka, paprika, aubergine, bär och prydnadsväxter i växthus. Mot svampangrepp i odling av tomat, sallat, kärnfrukt och stenfrukt i växthus och på friland. Mot svampangrepp på gräsytor. All annan användning är otillåten. Ingen karenstid krävs mellan behandling med TRIANUM-P och skörd.



**Hälsoskadlig**

### Riskupplysningar

Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka allergi vid inandning och hudkontakt.

### Skyddsanvisningar

Undvik inandning av damm och dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Använd lämpligt andningskydd (filtermask

med ett P3 filter) vid risk för inandning.

Vid kontakt med huden tvätta genast med tvål och vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn.

För mer information se säkerhetsdatablad.

**För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.**

**Verksam organism:** Trichoderma harzianum stam T-22.

**Innehåll:** 500 gram vattendispergerbart granulat (WG) innehållande  $1 \times 10^9$  sporer per gram.

**Produktnummer:** 12703

**Batch nr:** Se förpackningens lock.

**Används före:** Se förpackningens lock.

**Förvaring:** Förvaras svalt vid 8-10°C. Väl ursköld förpackning bör återvinnas.

**Tillverkare:** **Koppert B.V.**, P.O. Box 155  
2650 AD Berkel en Rodenrijs  
Nederländerna, tel. +31 10 5140444

**Återförsäljare:** Lindesro AB, Reslöv Lindesro  
241 72 Marieholm, tel. 042-161870  
[www.lindesro.se](http://www.lindesro.se)

## ALLMÄN INFORMATION

TRIANUM-P är ett biologiskt växtskyddsmedel som växer på rötterna och skyddar från jordburna skadesvampar genom flera mekanismer. TRIANUM-P fungerar bra vid olika miljöförhållanden. Den växer under ett brett temperaturområde (10-34°C), vid pH 4-8,5, på rötterna av många olika slags växter i många olika typer av odlingssubstrat. Tillför TRIANUM-P så tidigt som möjligt för optimal effekt.

## APPLICERING OCH DOS

Använd tillräcklig mängd vatten för att odlingssubstratet ska bli väl genomvattnat men undvik avrinning och dränering. För att öka sporens förutsättningar att fästa vid rötterna bör man undvika dränering de första två dagarna efter användning av produkten. Använd inte TRIANUM-P före sandfilter el likn. Se till att alla filter är rena (sporena kan fästa vid organiskt material i filter). Använd inte desinficeringsmedel i droppbevattningen från en dag före till två dagar efter tillsatsen. TRIANUM-P kan appliceras utan särskild utrustning. Efter behandling ska redskap och utrustning sköljas noga med vatten. Sporena i TRIANUM-P bör nå till rötterna snabbt. Sporkvaliteten försämras med tiden i vatten.

## Beredning av Trianum-P

- Produkten ska först blandas ut noga i en liten mängd vatten för att undvika klumpbildning.
- Tillsätt sedan vatten till total önskad volym beroende på användningsområde och dos.
- Använd produkten direkt efter beredning.
- Rör om kontinuerligt. Svampsporena sjunker annars till botten.

## Gurka, paprika, aubergine, bär och prydnadsväxter i växthus samt tomat, kärnfrukt och stenfrukt i växthus och på friland:

Förökning: Vattna ut 1,5 gram per m<sup>2</sup> odlad yta utblandat i 2,5 - 5 liter vatten direkt efter sådd eller plantering av sticklingar (rotade eller orotade).

Odling med hög planttäthet: Vattna ut 3 gram per m<sup>2</sup> odlad yta direkt efter plantering. Använd halv dos (1,5 gram/m<sup>2</sup>) om plantorna behandlats tidigare. Använd 2,5-5 liter vatten/m<sup>2</sup>. Upprepa behandlingen var 10:e vecka eller efter omplantering, även då med halv dos.

Odling i rader eller där plantorna står glest: Vattna ut 30 gram per 1000 plantor direkt efter plantering. Tillför halv dos (15 gram/1000 plantor) om plantorna behandlades under förökningen. Använd ca 100 liter vatten/1000 plantor. För stenfrukt och kärnfrukt används en liter vatten per planta. Upprepa behandlingen var 10:e vecka eller efter omplantering, även då med halv dos.

## Sallat i växthus och på friland:

Vattna ut 1,5 gram/m<sup>2</sup> odlad yta utblandat i 1,3 liter vatten direkt efter sådd. Vattna ut 3 kg/ha odlad yta utblandat i 500 liter vatten direkt efter utplantering.

## Gräsytor:

Behandla med TRIANUM-P när jordtemperaturen överstiger 8°C. Vattna ut 45 gram utblandat i 5 liter vatten/100 m<sup>2</sup> två gånger med ett intervall på 4 veckor under tidig vår. För fortsatt närvaro i rotzonen rekommenderas behandlingar var 4:e vecka under sommar och höst. Då med en dos på 15 gram/100 m<sup>2</sup>. För intensivt skötta ytor, t ex golfgreener, används 30 gram/100 m<sup>2</sup>. Den sista behandlingen görs minst 4 veckor innan gräset går in i vintervila. Vid nysådd/insådd torrbetas gräsfröna med 125 gram per 50 kg frö.

## BLANDBARHET

Tankmixa inte TRIANUM-P med andra produkter utan att först fråga din leverantör. TRIANUM-P är förenligt med de flesta gödselmedel, fungicider, insekticider och akaricider. Fråga din leverantör om information angående specifika kombinationer.

